

Số: 04 /TB-TT&BVTV

Tân Châu, ngày 12 tháng 6 năm 2024

## THÔNG BÁO

(*Tình hình dịch hại trên lúa Hè Thu 2024*)

Hiện nay thời tiết nắng nóng kèm mưa rào tạo điều kiện thuận lợi cho một số dịch hại trên lúa phát triển. Qua công tác thăm đồng điều tra phát hiện trên lúa hiện nay có sâu cuốn lá, rầy phấn trắng, bệnh do vi khuẩn, bệnh đạo ôn và bệnh vàng lá chín sớm đang phát triển. Dự báo thời gian tới các đối tượng này tiếp tục phát triển và gây hại.

Trước tình hình trên Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị bà con nông dân thực hiện một số biện pháp như sau:

- Thường xuyên thăm đồng kiểm tra tình hình phát triển cây lúa, tình hình dịch hại để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Bón phân cân đối theo nhu cầu từng giai đoạn sinh trưởng cây lúa, tránh bón thừa đạm làm cây mềm yếu sâu bệnh dễ tấn công.

- Áp dụng các biện pháp canh tác lúa theo 1 phải 5 giảm, IPM, SRP...

### + Đối với sâu cuốn lá:

Sâu cuốn lá nở rộ từ ngày 15/5/2024 và kéo dài đến cuối vụ Hè Thu. Giai đoạn dưới 40 ngày tuổi cây lúa có thể tự bù trừ khi bị sâu ăn lá tấn công, nên không cần sử dụng thuốc trừ sâu cuốn lá ở giai đoạn này để bảo vệ thiên địch. Giai đoạn sau 40 ngày nếu mật số từ 20 con/m<sup>2</sup> trở lên thì phun một trong các loại thuốc sau: INCIPIO 200SC, AMMERI 150EC, KATELUX 250EC, TAKUMI 20 WG, ... Lưu ý: Để diệt sâu hiệu quả nên phun thuốc khi sâu còn nhỏ tuổi 1 đến 2.

### + Đối với rầy phấn trắng (còn gọi là bọ phấn):

Khi đi thăm ruộng bà con cần đi xuống ruộng và khi vào quan sát thấy có những con nhỏ như hạt tấm màu trắng bay lên trên đọt lúa, trông giống như “bột phấn”. Quan sát trên bẹ và mặt dưới lá thấy có những con ấu trùng rầy phấn trắng nhỏ như hạt tấm mảnh hơi dẹp hình ô van màu trắng hơi trong đến trắng đục bám sát vào phần bẹ hoặc mặt dưới lá lúa, không di động. Khi ruộng bị rầy phấn trắng tấn công có triệu chứng điển hình là lá lúa bị vàng từ phân nửa trên và chết dần từ trên chóp lá xuống, các lá bên dưới bị vàng trước, cây lúa còi cọc phát triển kém, những nơi bị nặng làm cho lúa vàng đỏ từng chòm đóm dần dần chết khô đi.

Khi phát hiện rầy phấn trắng mật số cao có thể sử dụng một trong số các loại thuốc sau: Dầu khoáng SK ENSPRAY 99EC, ANTILUGENT 3HC, JAVIDAN 250WP, KATELUX 250EC, OSHIN 20WG, APPLAUD 10WP, CHESS 50WG, TT LED 70 WG, PEXENA 106SC... có thể phun thêm phân bón lá chứa đa trung vi lượng để giúp lúa phục hồi.



**+ Đối với bệnh do vi khuẩn: (gây cháy bìa lá, bệnh sọc lá và lem lép hạt)**

Cần thăm đồng thường xuyên nhất là những ruộng có bìa lá lúa to, bón thừa đạm, trồng các giống nhiễm khuẩn như: OM 5451, OM 18, Đài Thơm 8, Jasmine,... Lúa dưới 55 ngày tuổi thì chờ khi nào trên phiến lá lúa có xuất hiện các vết bệnh có sọc vàng hơi đỏ hoặc cháy khô hai bên bìa lá mới phun thuốc. Lúa vào giai đoạn trở nên phun ngừa vi khuẩn và nấm trước khi trở 7-10 ngày và sau khi trở 7-10 ngày. Thuốc phòng trừ lem lép do vi khuẩn gồm: STARNER 20WP, SASA 25WP, ASUSU 20WP, AVALON 8WP, ANTI-XO 200 WP, TOTAN 200WP,...

**Khuyến cáo chung:** Thời tiết như hiện nay lúa trước khi trở 7-10 ngày và sau khi trở 7-10 ngày nên kết hợp một loại thuốc trừ vi khuẩn như trên với một loại thuốc trừ nấm để phòng ngừa tốt bệnh lem lép hạt.

Thuốc phòng trừ nấm gây lem lép hạt: AMISTAR-TOP 325 SC, NATIVO 750WG, HELP 400SC, TILT SUPPER 300EC,...

**+ Đối với bệnh đạo ôn:** Chú ý những ruộng sạ dày, thừa phân đạm và trồng các giống nhiễm như IR 50404, Đài Thơm 8, OM 18, OM 5451, Jasmine,...

• Lúa ở giai đoạn trước trở chỉ tiến hành phun thuốc khi ruộng đã có vết bệnh đạo ôn xuất hiện trên lá.

• Đối với giống lúa nhiễm bệnh đạo ôn giai đoạn trở nên phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông trước khi trở 7-10 ngày và sau khi trở 7-10 ngày.

• Thuốc đặc trị bệnh đạo ôn như: FILIA 525SE, BEAM 75WP, TRIDOZOLE 75WG, BUMP 650WP ...

**+ Bệnh vàng lá chín sớm:** Xuất hiện và gây hại trên trà lúa ở giai đoạn trở chín mức độ nhẹ đến trung bình, cục bộ có một số ruộng nhiễm nặng. Phun thuốc phòng trị bệnh vàng lá chín sớm ngay khi thấy lá chân có xuất hiện vết bệnh. Thuốc phòng trị bệnh vàng lá chín sớm như: RIDOMIL GOLD 68WG, CURZATE M8 72WP, AMISTAR 250SC, FAMERTIL 300EC, STREPGOLD 100WP, AC-BOSCA 300SC,...

- **Lưu ý:** Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng “đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc và đúng cách”

Ngoài ra bà con nông dân cần chú ý theo dõi và có biện pháp phòng trừ một số đối tượng dịch hại khác như: Chuột, rầy nâu, sâu đục thân, lem lép hạt,...

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông báo đến nông dân biết để chủ động bảo vệ thắng lợi vụ lúa Hè Thu năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- Chi Cục TT&BVTV;
- TT. thị Ủy, HĐND, UBND;
- PCT. Đặng Văn Né;
- Phòng Kinh tế;
- Đài Phát Thanh TX (hỗ trợ phát trên đài);
- Các thành viên BCĐ PTDH trên lúa;
- Hội Nông dân thị xã (hỗ trợ tuyên truyền).
- Trạm Khuyến nông;
- UBND, nhân viên TT&BVTV các xã, phường;
- Lưu VT.

